





Verband für den Gefässzugang



Via Finati, 4-4/A - Ferrara - ITALY Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414 www.emodial.com - info@emodial.com

Importer & CH-REP:



Heldswilerstrasse 13 | CH-9214 Kradolf Tel. +41 (0)71 642 35 68 | info@fornimedical.ch www.fornimedical.ch





BESCHREIBUNG

BETAFIX° As ist ein elastischer Verband mit einem saugfähigen Pad und einem Silberionen-freisetzenden, nicht haftenden Film, der an einem Ende mit einem Pflaster versehen ist, um die Abdichtung zu gewährleisten.

VERWENDUNGSZWECK

- Komprimierende hämostatische Wirkung der arteriovenösen Fisteln (AVF).
- Eindämmung von Exsudaten am Ende von Dialysebehandlungen, intravenösen Therapien, Bluttransfusionen.
- Schutz des Gefässzugangs in der Zeit nach der Behandlung.


VERWENDUNGSNUTZEN

- Der Silberionen-freisetzende Film garantiert eine sofortige und lang anhaltende antibakterielle Wirksamkeit und trägt dazu bei, das Risiko von Infektionen an der Austrittsstelle zu verringern.
- Reduziert die mit wiederholten Venenpunktionen verbundenen Entzündungsanzeichen, wie z. B. die einer arteriovenösen Fistel (AVF).
- Verhindert die Schorfbildung und macht die nächste AVF-Venenpunktion weniger traumatisch für den Patienten.
- Fördert die Regeneration der Haut.



BESTELLDATEN

CODE	VERBAND (cm)		PAD	STÜCK/	PACKUNGEN /
	l←	Ţн	(cm)	PACKUNG	вох
S0029/AG	50 ± 10%	6	2.5 x 2.5	1	100
S0030/AG	50 ± 10%	6	2.5 x 2.5	2	50
S0015/AG	50 ± 10%	6	3.5 x 3.5	1	50
S0014/AG	50 ± 10%	6	3.5 x 3.5	2	50



GEBRAUCHSANWEISUNG

Nach dem Entfernen der Nadel und der Sicherstellung der Reduzierung des Blutflusses:

- 1. Rollen Sie den ersten Teil des Verbandes mit dem Pad ab.
- Legen Sie den Pad an der Stelle auf den Arm, an der die Nadel entfernt wurde.
- Den Verband um den Arm wickeln und dabei die notwendige Spannung aufrechterhalten, um die Blutstillung zu gewährleisten und ihn in Position zu halten.
- **4.** Stellen Sie sicher, dass die angewandte Spannung nicht zu hoch ist, um die Fistel nicht zu beschädigen.
- Entfernen Sie das Schutzpapier des sich am am Ende befindlichen Pflasters und kleben Sie es auf den Verband, um es am Arm zu fixieren.

